

Sauvetage du Martinet/ Hirondelle

Marylise POMPIGNAC, marylise@gmail.com, 06.87.06.61.84

Le martinet noir se nourrit exclusivement d'Insectes volants
En hospitalisation respecter cet impératif afin d'éviter les carences létales
Si présence de barre de stress sur les plumes => impossible à relâcher car cassure de
plume => impossible à voler = mort assurée
Migration de 9 à 10 000km / Afrique australe

Alimentation :

Le parent amène 1 boulette au retour au nid pour ses petits = 1500 à 2000
insectes/boulette, chaque individu consomme 20000/jour (d'où l'importance de leur
présence dans nos villes)

Matériel et méthode de nourrissage :

Dans la grande caisse d'hospitalisation (envergure du martinet = 45 cm) : faire un trottoir
pour qu'ils dorment en hauteur et fassent leurs besoins en dehors

8% vinaigre blanc pour désinfection matériel de nourrissage (coupelle, pince, verre)

Doigtier pour nourrissage

Alcool pour désinfecter les mains

Grillons surgelés à décongeler et à donner à température ambiante impérativement (idem
que pour les reptiles) : retirer pattes et exosquelette, juste abdomen + Larves; dans
jardinerie taille 7 ou 8 ; larve de teigne de ruche (Dès que taches noires sur grillon = à
jeter car toxique)

Attention ⚠ la congélation tue la vitamine B

Par Veterinaire : Injection de vitamine dans la pliure du genou.

La langue a un os et peut se casser, Ne jamais forcer l'oiseau !

Ne jamais le serrer car le martinet ne supporte pas la contention

2g d'insectes volants à chaque repas soit, une douzaine, en 2fois/ repas

Entre 5 et 6 repas /adulte et 8 pour bébé = toutes les heures

12 à 15g/jour

Chaque Couple revient tjs au même endroit, les partenaires arrivent à 2-3h d'écart et le
nicheur ira jusqu'à se blesser pour rentrer à l'endroit précis du nid. Respecter l'endroit
exact au cm près (il essayera d'entrer dans son nid jusqu'à ce que mort s'en suive. Retirer
les ouvertures dans les soupendes de toit et toitures, est catastrophique pour cet
insectivore indispensable)

Précautions avant le relâcher :

Pointe en vol à 200km/h donc vol ultra parfait. Toute fracture même calcifiée peut
condamner le martinet ne pouvant plus voler avec précision.

Œil abîmé = euthanasie

Poids de l'individu : 36g = petit gabari

Pour le relâcher :

Bréchet musclé
Poids de départ 40g
À l'endroit où se trouve son/un groupe

Test avant le relâcher :

Dans pièce entièrement aménagée de rideaux sur les 4 murs. Au sol mettre l'oiseau sur le dos, il doit se remettre sur ses pattes aussitôt - pas sur moquette car à risque.

Cloaque Bréchet Ailes en parfait état

Si non retournement = ceinture scapulaire brisée

À éviter au maximum :

Jamais sur dos car pas physiologique

Éviter de manipuler

Vulnérabilité du martinet :

Martinet espérance de vie 4 ans au lieu de 20 à 27 ans

Causes :

Urbanisme

Pollution

Insecticides

Destruction de son habitat

Limiter le stress durant l'hospitalisation :

Parler doucement pour éviter le stress car le silence est un comportement de prédateur

Par Veterinaire uniquement :

Euthanasie : Ketamine en sous cutanée en surdose / idéal serait une fois endormi